

Il est impératif de lire avec attention cette notice avant toute utilisation car elle contient des informations importantes relatives à l'utilisation du produit.

EN CAS DE DOUTE OU DE QUESTION, IL EST IMPÉRATIF DE DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

DÉNOMINATION : Molutrex

Substance : hydroxyde de potassium

COMPOSITION : 1 mL de solution contient 50 mg d'hydroxyde de potassium et de l'eau purifiée.

PRÉSENTATION : Un flacon de 3 mL contenant une solution à appliquer sur la peau, un bouchon sécurité avec pinceau et un applicateur fin.

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT : ACM

17, rue de Neuilly, Impasse Passoir, 92110 Clichy-La-Garenne - FRANCE

DANS QUEL CAS UTILISER CE PRODUIT ?

Ce produit est préconisé dans le traitement des Molluscum contagiosum.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE PRODUIT ?

Ce produit ne **DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** :

- sur les muqueuses et sur le contour de l'œil
- sur les enfants de moins de 2 ans.
- en cas d'allergie à l'un des composants.
- sur les Molluscum contagiosum infectés ou déjà enflammés.
- sur des verrues classiques et toute autre kératinisation de la peau.



MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

ATTENTION ! Ce produit peut être corrosif en cas d'utilisation inappropriée. Ne laisser pas le liquide entrer en contact avec la peau saine. Se laver les mains après chaque utilisation.

- ne pas utiliser sur le contour de l'œil, sur les muqueuses, sur les plaies ouvertes ou de la peau lésée par grattage.
- afin d'éviter une éventuelle infection, ne pas gratter ou arracher les Molluscum contagiosum.
- en cas d'allaitement, ne pas utiliser cette solution sur les parties du corps qui peuvent être en contact avec le nourrisson.
- ne pas utiliser chez les patients atteints d'eczéma atopique en phase aiguë.
- ne pas utiliser chez les personnes dont le système immunitaire est déficient.

REMARQUES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ :

- en cas de contact avec la peau autour du Molluscum contagiosum, rincer à l'eau.
- en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin.
- ne pas se frotter les yeux ou les muqueuses si le produit a coulé accidentellement sur les doigts. Se laver les mains rapidement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, vous devez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMMENT UTILISER CE PRODUIT ?

Usage externe. Lors de l'utilisation de la solution, poser le flacon sur une surface plane afin d'éviter de renverser le flacon. L'application doit être effectuée exclusivement par un adulte.

POSOLOGIE :

1 à 2 applications par jour, matin et soir. Dès l'apparition de l'inflammation (rougeur), cesser l'application. Appliquer la solution uniquement sur les Molluscum contagiosum à traiter en épargnant la peau saine.

CONSEILS D'UTILISATION :

1/ À faire avant la première utilisation :

Remplacer le bouchon du flacon par le bouchon sécurité enfant muni du pinceau. Cet étui contient aussi un applicateur fin préconisé pour une application plus précise sur les Molluscum contagiosum de très petite taille. Vérifier que la bague d'invulnérabilité n'est pas rompue avant la première utilisation. (A)

2/ Application de Molutrex :

Ouvrir le flacon, le poser sur une surface plane afin d'éviter de le renverser puis tremper le pinceau ou l'applicateur fin dans la solution. Essuyer le pinceau ou l'applicateur fin sur le rebord du flacon pour éviter qu'une goutte ne se forme. (B)

À l'aide du pinceau ou l'applicateur fin, appliquer la solution sans excès sur les Molluscum contagiosum, sans déborder sur la peau saine. (C)

Recharger le pinceau ou l'applicateur fin en produit toutes les 2 ou 3 applications. Bien refermer le bouchon sécurité enfant après chaque utilisation.

3/ Séchage :

Laisser sécher, dans le cas d'un enfant veillez à ce qu'il ne touche pas les parties traitées pendant le temps de séchage.

4/ Répéter l'application 1 à 2 fois par jour :

Renouveler les applications sur un même Molluscum contagiosum pendant plusieurs jours jusqu'à l'apparition d'une inflammation (rougeur), habituellement entre 2 à 10 jours.

5/ Arrêt de l'application :

Dès l'apparition de l'inflammation d'un Molluscum, arrêter l'application de Molutrex sur ce Molluscum. (D)

L'inflammation est le signe de la disparition prochaine du Molluscum contagiosum qui aura lieu dans les 2 à 6 semaines qui suivent.

ATTENTION : Ne pas appliquer la solution sur un même Molluscum contagiosum au-delà de 14 jours. Si vous n'obtenez aucun résultat, informer votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout produit, celui-ci peut entraîner des effets plus ou moins gênants, notamment risque de sensations de brûlures et d'irritations transitoires, l'intensité de l'irritation dépend de la sensibilité de la peau et de la quantité de solution appliquée. Veillez à respecter les conseils d'utilisation.

Une hyperpigmentation ou hypopigmentation peut apparaître après la disparition de certains Molluscum contagiosum traités. Elle disparaîtra spontanément.

La formation d'une cicatrice est très rare, le risque est maximal lorsque les Molluscum sont grattés.





SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification à ACM et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ ou le patient est établi.

CONSEILS : Le Molluscum contagiosum est une affection cutanée contagieuse due à un virus. Afin d'éviter la dissémination du virus, nous vous conseillons de :

- ne pas partager votre linge de toilette,
- éviter de partager des bains, piscine, sports de contact,
- éviter le grattage des Molluscum contagiosum,
- éviter les contacts sexuels pendant la durée de l'affection.

CONSERVATION : Ne pas dépasser la date d'utilisation figurant sur le flacon. Bien refermer le flacon après usage. Stocker le produit en position verticale. Tenir hors de portée des enfants. Le flacon peut se conserver 1 mois après ouverture. Conserver le produit à température ambiante entre 15°C et 25°C.



Date de 1^{er} marquage :

16/07/2009

Version de la présente

notice : Mars 2022



LOT

Numéro de lot



Date de péremption



Date de fabrication