

ALGESAL BAUME® crème

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

Composition : Pour 100 g de crème :

Acide salicylique 6,54 g
Diéthylamine 3,46 g

Excipient : paraffine liquide légère, monostéarate d'éthylène glycol, acide stéarique, vaseline, cire micro-cristalline, monostéarate de glycérol, trolamine, composition lavandin*, eau purifiée.

*Composition de la composition lavandin : huile essentielle de lavandin grosso, huile essentielle et fractions d'huile essentielle d'eucalyptus de Chine, linalol, acétate de linalyle, camphre racémique.

Forme pharmaceutique : Crème. Tube de 40 g ou 100 g.

Classe pharmaco-thérapeutique :

A visée antalgique (M : SYSTEME LOCOMOTEUR).

Titulaire :

Pharma développement - ZI chemin de Marcy
58800 CORBIGNY - FRANCE

Exploitant :

Pharma développement - ZI chemin de Marcy
58800 CORBIGNY - FRANCE

Fabricant : Pharma développement - ZI chemin de Marcy
58800 CORBIGNY - FRANCE

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES) :

Traitement local d'appoint des douleurs d'origine musculaire et tendino-ligamentaire.

ATTENTION !

Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications) :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Allergie aux salicylés, à un médicament apparenté (AINS, aspirine) ou à un autre des composants.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux, sur une plaie, une lésion suintante, une lésion infectée, ni sous pansement occlusif.

Ce médicament ne doit pas être utilisé, en raison de la présence de dérivés terpéniques dans la formule, dans les cas suivants :

- nourrissons de moins de 30 mois,
 - enfants ayant eu des convulsions dues à la fièvre ou non.
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde spéciales : Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respectez les conseils d'utilisation :

- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée (cf 'Posologie'),
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- respecter la fréquence et la durée du traitement préconisées.

Précautions d'emploi :

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus

de 7 ans.

Après usage, il est nécessaire de se laver les mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux et les muqueuses.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, demander conseil à votre médecin.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement :

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.

Excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients : Dérivés terpéniques (cf. 'Effets non souhaités et gênants').

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie : RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE 7 ANS.

En massages locaux sur la zone douloureuse, 2 à 3 fois par jour, jusqu'à pénétration complète. Se laver les mains après utilisation.

Mode et voie d'administration : Voie cutanée.

Durée de traitement : Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES) :

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : *éventuelle réaction allergique locale nécessitant l'arrêt du traitement.*

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées :

- risque de convulsions chez l'enfant et chez le nourrisson,
 - possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.
- Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien et à signaler tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation :

A conserver à une température inférieure ou égale à 25°C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Sept. 2006.

Ceci est un médicament.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.