

NOTICE

Anthelmin[®]

comprimés pelliculés pour chat

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

KRKA, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovénie

Fabricant responsable de la libération des lots :

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Croatie

KRKA, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovénie

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Allemagne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

ANTHELMIN[®] COMPRIMÉS PELLICULES POUR CHATS

Pyrantel / Praziquantel

3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS

Un comprimé pelliculé contient :

Substances actives:

Pyrantel..... 80,0 mg

(sous forme d'embonate)

(équivalent à 230 mg d'embonate de pyrantel)

Praziquantel..... 20,0 mg

Comprimé pelliculé blanc ou presque blanc, biconvexe, ovale, marqué d'un côté. Le comprimé peut être divisé en deux moitiés égales.

4. INDICATIONS

Chez les chats :

Traitement des infestations mixtes par les nématodes et les cestodes chez les chats, causées par :

- des ascarides adultes: *Toxocara cati* (syn. *mystax*)
- des ankylostomes adultes: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*
- des cestodes: *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Hydatigera* (*Taenia*) *taeniaeformis*, *Mesocestoides* spp., *Joyeuxiella pasqualei*.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'un des excipients.

Voir rubrique « Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte » et rubrique « Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions ».

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Des affections digestives légères et transitoires telles que l'hypersalivation et/ou le vomissement et des troubles neurologiques légers et transitoires tels que l'ataxie peuvent se produire dans des cas très rares.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit:

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.



7. ESPÈCES CIBLES

Chats.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

5 mg de praziquantel et 20 mg de pyrantel (57,5 mg d'émulsion de pyrantel) par kg de poids corporel. Soit 1 comprimé pour 4 kg de poids corporel selon le tableau suivant :

Poids corporel	Nombre de comprimés par prise
1,0 à 2,0 kg	1/2
2,1 à 4,0 kg	1
4,1 à 6,0 kg	1 + 1/2
6,1 à 8,0 kg	2

Les chatons pesant moins de 1 kg ne doivent pas être traités avec le médicament vétérinaire, car la posologie correcte ne peut être garantie.

Voie d'administration: Voie orale.

Les comprimés doivent être administrés directement dans la bouche, mais peuvent être administrés dans une petite quantité de nourriture, si nécessaire.

Durée d'utilisation: Traitement unique.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

En cas d'infestation par des ascarides, en particulier chez les chatons, l'élimination complète des parasites est difficile, un risque de contamination pour les humains peut donc persister. Par conséquent, des traitements répétés avec un produit nématodicide approprié doivent être effectués à des intervalles de 14 jours jusqu'à 2-3 semaines après le sevrage.

10. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver les demi-comprimés inutilisés en dessous de 25°C.

Chaque fois qu'un demi-comprimé inutilisé est conservé jusqu'à sa prochaine utilisation, il doit être remis dans la plaquette ouverte et conservé dans un endroit sûr et hors de la vue et de la portée des enfants.

Durée de conservation des demi-comprimés après première ouverture du conditionnement primaire : 1 mois.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte après EXP. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

11. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRES

Précautions particulières à chaque espèce cible :

L'infestation par les cestodes survient chez les chats au plus tôt dans la troisième semaine de vie.

Les puces servent d'hôtes intermédiaires pour un type commun de cestodes, *Dipylidium caninum*.

L'infestation par les cestodes peut réapparaître si un contrôle des hôtes intermédiaires, tels que les puces et les souris n'est pas entrepris.

Les pratiques suivantes doivent être évitées, car elles augmentent le risque de développement de résistances et pourraient conduire à une thérapie inefficace :

- Une utilisation trop fréquente et répétée d'anthelminthiques de la même classe, pendant une longue période.
- Un sous-dosage, cela peut être dû à une sous-estimation du poids corporel ou à une mauvaise administration du médicament vétérinaire.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Par mesure d'hygiène, les personnes administrant les comprimés directement au chat ou les ajoutant à sa nourriture, doivent se laver les mains après l'administration.

Autres précautions

L'échinococcose représente un danger pour l'homme. L'échinococcose est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE). Des directives spécifiques concernant le traitement et le suivi, ainsi que la protection des personnes, doivent être obtenues auprès de l'autorité compétente concernée.

Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte :

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation. Utilisation non recommandée durant toute la gestation, mais le médicament vétérinaire peut être utilisé pendant la lactation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions:

Ne pas administrer simultanément avec de la pipérazine, car les effets spécifiques de la pipérazine (paralysie neuromusculaire du parasite) peuvent inhiber l'efficacité du pyrantel (paralysie spastique du parasite).

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire:

Les symptômes de surdosage ne se produisent pas à moins de 5 fois la dose recommandée. Le premier signe d'intoxication attendu est le vomissement.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

13. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

13/02/2020

14. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Usage vétérinaire.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 2 comprimés pelliculés
Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 2 comprimés pelliculés
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 10 comprimés pelliculés

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/0319717 6/2017

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Exploitant : KRKA France, 12-14, rue de l'Eglise, 75015 Paris, France