

# ELGYDIUM CLINIC

## Cicalium GEL

**FR** Aide au traitement des aphtes et des lésions buccales pour soulager la douleur et favoriser la cicatrisation. Les aphtes buccaux et les lésions buccales sont des inflammations qui apparaissent sur la muqueuse buccale. Ils se présentent sous la forme de lésions érythémateuses similaires à des brûlures et des plaies telles que des ulcères douloureux, qui rendent la mastication et la déglutition difficiles, compromettant ainsi la qualité de vie du patient. Effet barrière protecteur jusqu'à 8 heures\*

**Indications :** Indiqué pour le traitement des aphtes, des ulcères aphteux, des irritations et des lésions buccales causés par la chirurgie, les bagues et les prothèses mal ajustées. ELGYDIUM CLINIC Cicalium Gel agit en formant une barrière protectrice dans la bouche. Il adhère aux parois internes et les protège, apportant ainsi un soulagement de la douleur et favorisant la cicatrisation. Sans alcool.

**Précautions d'emploi :** Appliquer directement sur la lésion 3 à 4 fois par jour à l'aide de l'applicateur. Éviter de manger et de boire pendant au moins 1 heure après l'application. Prêt à l'emploi. ELGYDIUM CLINIC Cicalium Gel n'est pas nocif en cas d'ingestion. Il peut être utilisé chez l'adulte et l'enfant.

**Contre-indications, avertissements et précautions :**

Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas avaler le produit. Ne pas dépasser la posologie recommandée. Tenir hors de la portée des enfants. Aucune donnée n'est disponible concernant l'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement. Aucune donnée n'est disponible concernant l'utilisation concomitante de médicaments : consulter un médecin. Éviter tout contact avec les yeux ; en cas de contact, rincer abondamment à l'eau. La date de péremption se réfère au produit non ouvert et correctement stocké. Refermer le tube après utilisation.

Conserver entre 5 °C et 30 °C à l'abri de toute source de chaleur directe.

En cas de problèmes pendant le traitement, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

En cas d'incident grave lié à l'utilisation de ELGYDIUM CLINIC Cicalium Gel, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité locale compétente.

Dispositif Médical marqué CE en : 2015.

Date de révision de la notice : REV.01 - 6 Février 2023.

Distribué en France par PIERRE FABRE MEDICAMENT.

Tube de 8ml et sachet de 2ml.

\* Sur la base d'un test *In vitro*