

Excilor® FORTE Color



Excilor® FORTE Color
pour traiter
les ongles infectés.



Vernis à ongles
cosmétique pour
recouvrir les ongles
sains.

Quand utiliser Excilor® FORTE Color ?

Pour le traitement de la mycose de l'ongle chez l'adulte.

- Traite et couvre
- Extra fort contre la mycose de l'ongle
- Vernis traitant coloré + Vernis classique coloré
- Cliniquement Prouvé
- 24 h de pénétration continue avec TransActiv Technology

Lire attentivement le mode d'emploi.

Qu'est-ce qu'une «mycose de l'ongle» ?

La mycose de l'ongle (aussi appelée onychomycose) est l'infection d'un ongle de la main ou du pied par une mycose. L'infection commence le plus souvent sur la périphérie de l'ongle qui devient jaunâtre, brune ou verte. La mycose se glisse sous ou dans l'ongle et entraîne un épaississement friable de l'ongle. L'ongle peut parfois se détacher totalement ou partiellement, ce qui peut être douloureux.

Comment apparaît la mycose de l'ongle ?

Les infections mycosiques de l'ongle apparaissent souvent à cause d'une humidité excessive, de la chaleur, de la transpiration, avec l'âge ou quand le système immunitaire est affaibli. L'ongle est normalement trop épais pour laisser passer la mycose, mais des ongles détériorés peuvent s'infecter facilement. La prolifération de mycoses peut provenir de chaussures trop étroites et/ou d'une transpiration des pieds. Les infections mycosiques sont aussi transmissibles (p. ex. via des douches communes). Vous pouvez aussi vous infecter vous-même : un seul ongle mycosique peut suffire à contaminer un autre ongle. Certaines personnes (diabétiques, patients sous corticoïdes, patients immunodéficients) sont davantage sujettes aux mycoses. Traitez les à temps : plus l'infection est circonscrite rapidement et moins le traitement sera long. Vous évitez en outre l'infection d'autres ongles.

Comment prévenir la mycose de l'ongle ?

Lavez-vous régulièrement les pieds. Si vous utilisez du savon, rincez abondamment afin d'en éliminer tout résidu.

Séchez-vous bien les pieds, surtout entre les orteils.

Portez des chaussettes en coton ou en laine propres.

Portez des chaussures bien aérées, pas trop étroites.

Changez régulièrement de chaussures.

Employez un produit antimycosique pour les chaussures.

Portez des sandales dans les locaux où un grand nombre de personnes marche pieds nus, comme dans les douches, vestiaires et à la piscine.

Mode d'emploi

1. Excilor® FORTE Color doit être appliqué une fois par jour de préférence après la douche. Nettoyez l'ongle, (si vous portez un vernis à ongles, retirez-le complètement) avant l'application. **Bien secouer la bouteille avant utilisation.**

2. Ensuite, appliquez une couche uniforme d'Excilor® FORTE Color sur toute la surface de l'ongle à traiter. Retirez délicatement tout excès de produit ayant débordé sur la peau. La bouteille peut contenir des agglomérats de résidus de film sec. Essuyez les éventuels agglomérats de film sec sur le pinceau. Ceci est normal et est provoqué par le séchage au contact de l'air. Cela n'a aucune influence sur la performance ou la qualité du produit.

3. Laissez sécher l'ongle. **Cela prend entre 3 et 5 minutes.** Un film légèrement brillant est formé. Pour un effet optimal, il est conseillé d'attendre 5 minutes avant de mettre des chaussettes et/ou des chaussures. Après application, une sensation de picotement sous l'ongle est normale et indique que le produit est en train de pénétrer dans l'ongle. Excilor® FORTE Color ne doit pas être utilisé sur des ongles sains. Un vernis à ongles classique (cosmétique) de la même couleur est disponible.

4. Le film formé sur l'ongle est résistant à l'eau et à des contraintes physiques telles que le frottement. Cependant, au niveau de la partie haute de l'ongle, de petites parties du film peuvent se détacher/libérer. Cela n'affectera pas l'efficacité du produit. Une couche de vernis à ongles peut être appliquée sur le film transparent une fois sec.

5. **Après 24 heures, retirez le film. Décollez le film par un angle puis rouler le film doucement jusqu'à libérer l'ongle complètement.** L'eau chaude peut faciliter le décollage. Appliquez de nouveau le produit, comme indiqué ci-dessus. Lavez-vous bien les mains après chaque retrait et nouvelle application. Pour de meilleurs résultats, traitez l'ongle pendant un minimum de trois mois et continuez le traitement jusqu'au rétablissement complet de l'ongle.

Assurez-vous que la bouteille est bien fermée après chaque utilisation pour éviter l'évaporation du produit. Un surplus de film peut se former sur le rebord du flacon.

Comment agit Excilor® FORTE Color sur la mycose de l'ongle ?

Le composant le plus important de l'ongle est la kératine, qui est pratiquement imperméable à la plupart des préparations

antimycosiques. Dans la majorité des cas, la mycose est aussi présente sous l'ongle, ce qui complique le traitement.

Excilor® FORTE Color contrôle le micro-environnement de l'ongle en acidifiant le lit de l'ongle. Excilor® FORTE Color contient des substances acides capables de pénétrer l'ongle de sorte que l'ongle est traité "de l'intérieur vers l'extérieur". Excilor® FORTE Color abaisse immédiatement le pH de l'ongle et rend ainsi l'environnement hostile à la prolifération des mycoses. L'ongle détérioré doit toutefois avoir le temps de repousser. Plusieurs mois peuvent être nécessaires avant que l'ongle touché semble de nouveau totalement sain. Un ongle de pied pousse d'à peine +/- 1,5 mm par mois. L'efficacité Excilor® FORTE Color est prouvée par des essais cliniques.

⚠ Mesures de précautions

Produit à usage externe.

Appliquer sur l'ongle uniquement, éviter le contact avec la peau autour de l'ongle.

Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau.

Il n'y a pas de données cliniques disponibles chez l'enfant, pendant la grossesse ou l'allaitement.

Les diabétiques ayant des problèmes aux pieds doivent consulter leur médecin avant de commencer le traitement Excilor® FORTE Color.

Il est préférable de poursuivre le traitement jusqu'à la guérison complète de l'ongle. Si aucun effet n'est observé après 3 mois de traitement, consultez votre médecin généraliste.

Effets secondaires

Une sensation d'irritation, démangeaison ou une douleur légère et locale.

Arrêtez le traitement et consultez un pharmacien ou un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent.

Veillez signaler toute suspicion d'incident grave avec ce produit au fabricant à l'adresse info@excilor.com, ainsi qu'à l'ANSM (FR), FAGG (BE), Swissmedic (CH), ceci est important pour la surveillance continue du rapport bénéfice/risque du produit.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un des composants.

Composition Excilor® FORTE Color NUDE

Polyurethane-32, Aqua, Acetic acid (3.00% w/w), Iodopropynyl Butylcarbamate, Sorbitan Sesquileate, Polysorbate 80, Cetyl Acetate, Acetylated Lanolin Alcohol, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Biotin, Xanthan gum, C12-13 Alkyl Lactate, Pinus Sylvestris Oil, CI 77891, CI 11680, CI 12490, CI 74160, Sodium Citrate, Sodium Laureth Sulfate, Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate, Glycerin.

Composition Excilor® FORTE Color ROUGE CORAIL

Polyurethane-32, Aqua, Acetic acid (3.00% w/w), Iodopropynyl Butylcarbamate, Sorbitan Sesquileate, Polysorbate 80, Cetyl Acetate, Acetylated Lanolin Alcohol, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Biotin, Xanthan gum, C12-13 Alkyl Lactate, Pinus Sylvestris Oil, CI 11680, CI 12490, Sodium Laureth Sulfate, Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate, Glycerin.

Conditions de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante (5-25°C) et à l'abri de la lumière ou d'une source de chaleur.

Bien refermer la bouteille après utilisation.

Bien secouer la bouteille avant utilisation.

N'utilisez pas le produit après la date de péremption mentionnée sur l'emballage.

Contenu de l'emballage

Les formats d'emballage suivants sont disponibles :

Excilor® FORTE Color - bouteille de 30 ml e

Composition vernis à ongles cosmétique NUDE

INGREDIENTS: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydride Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Isopropyl Alcohol, Acrylates Copolymer, Stearalkonium Bentonite, n-Butyl Alcohol, Styrene/Acrylates Copolymer, CI 77891, Silica, Benzophenone-1, Trimethylpentanediyl Dibenzoate, Polyvinyl Butyral, CI 19140, CI 77491, Diacetone Alcohol.

Composition vernis à ongles cosmétique ROUGE CORAIL

INGREDIENTS: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Acetyl Tributyl Citrate, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acrylates Copolymer, Stearalkonium Bentonite, n-Butyl Alcohol, Styrene/Acrylates Copolymer, CI 19140, CI 77491, CI 15850, Silica, Benzophenone-1, CI 77891, Trimethylpentanediyl Dibenzoate, Polyvinyl Butyral, Diacetone Alcohol.

8 ml e

Medi-fill BV - Egelskoog 9 - NL 1822 BM, Alkmaar

