

Excilor® FORTE

Pour le traitement de la mycose de l'ongle

Qu'est-ce qu'une «mycose de l'ongle» ?

La mycose de l'ongle (aussi appelée onychomycose) est l'infection d'un ongle de la main ou du pied par une mycose. L'infection commence le plus souvent sur la périphérie de l'ongle qui devient jaunâtre, brune ou verte. La mycose se glisse sous ou dans l'ongle et entraîne un épaississement friable de l'ongle. L'ongle peut parfois se détacher totalement ou partiellement, ce qui peut être douloureux.

Comment apparaît la mycose de l'ongle ?

Les infections mycosiques apparaissent sur les ongles et à l'intérieur des ongles - le plus souvent sur les ongles de pieds - à cause d'une humidité excessive, de la chaleur, de la transpiration et parfois par un manque d'hygiène. L'ongle est normalement trop épais pour laisser passer la mycose, mais des ongles détériorés peuvent s'infecter facilement. La prolifération de mycoses peut provenir de chaussures trop étroites et/ou d'une transpiration des pieds. Les infections mycosiques sont aussi facilement transmissibles (p. ex. via des douches communes). Vous pouvez aussi vous infecter vous-même : un seul ongle mycosique peut suffire à contaminer les autres ongles. Certaines personnes (personnes diabétiques, sous cortisone, immunodéficientes) sont plus sensibles aux infections mycosiques. Traitez les à temps : plus l'infection est circonscrite rapidement et moins le traitement sera long. Vous évitez en outre l'infection d'autres ongles.

Comment prévenir la mycose de l'ongle ?

- Lavez-vous régulièrement les pieds.
- Si vous utilisez du savon, rincez abondamment afin d'éliminer tout résidu.
- Séchez-vous bien les pieds, surtout entre les orteils.
- Portez des chaussettes en coton ou en laine propres.
- Portez des chaussures bien aérées, pas trop étroites. Changez régulièrement de chaussures.
- Employez un produit antimycosique pour les chaussures.
- Portez des sandales dans les locaux où un grand nombre de personnes marche pieds nus, comme dans les douches, vestiaires et à la piscine.

Excilor® FORTE

Comment agit Excilor® FORTE sur la mycose de l'ongle ?

Le composant le plus important de l'ongle est la kératine, qui est pratiquement imperméable à la plupart des préparations antimycosiques. Dans la majorité des cas, la mycose est aussi présente sous l'ongle et à l'intérieur de l'ongle, ce qui complique le traitement. **Excilor® FORTE** contrôle le micro-environnement de l'ongle en acidifiant le lit de l'ongle. **Excilor® FORTE** contient des substances acides capables de pénétrer l'ongle de sorte que l'ongle est traité "de l'intérieur vers l'extérieur". **Excilor® FORTE** abaisse immédiatement le pH de l'ongle et rend ainsi l'environnement hostile à la prolifération des mycoses. L'ongle détérioré doit toutefois avoir le temps de repousser. Plusieurs mois peuvent être nécessaires avant que l'ongle touché semble de nouveau totalement sain. Un ongle de pied pousse d'à peine +/- 1,5 mm par mois. L'efficacité **Excilor® FORTE** est prouvée par des essais cliniques.

Mode d'emploi



Excilor® FORTE doit être appliqué une fois par jour de préférence après la douche. Nettoyez l'ongle, (si vous portez un vernis à ongles, retirez-le complètement) avant l'application. Bien secouer la bouteille avant utilisation.



Utilisez le pinceau pour enduire l'ensemble de la surface de l'ongle. Veillez à appliquer généreusement **Excilor® FORTE**. La bouteille peut contenir des agglomérats de film séché, provoqué par le contact avec l'air. Ce phénomène est normal et n'a aucune influence sur la performance ou la qualité du produit. À l'aide d'un tissu, enlevez les agglomérats de la brosse.



Laissez sécher l'ongle. Cela prend entre 3 à 5 minutes. À l'application, le produit a une couleur blanche et un film collant se forme, au séchage le film devient transparent et l'effet collant s'estompe. Pour un effet optimal, il est conseillé d'attendre jusqu'à cinq minutes avant de mettre des chaussettes et/ou des chaussures. Il est normal d'avoir une sensation de picotement sous l'ongle après l'application. Cela prouve que le produit a pénétré entièrement dans l'ongle.



Le film formé sur l'ongle est résistant à l'eau et à des contraintes physiques telles que le frottement. Cependant, au niveau de la partie haute de l'ongle, de petites parties du film peuvent se détacher/libérer. Cela n'affectera pas l'efficacité du produit. Une couche de vernis à ongles peut être appliquée sur le film transparent une fois sec.



Après 24 heures, retirez le film. Décollez le film par un angle puis rouler le film doucement jusqu'à libérer l'ongle complètement. L'eau chaude peut faciliter le décollement. Appliquez de nouveau le produit, comme indiqué ci-dessus. Lavez-vous bien les mains après chaque retrait et nouvelle application. Pour de meilleurs résultats, traitez l'ongle pendant un minimum de trois mois et continuez le traitement jusqu'au rétablissement complet de l'ongle. **Excilor® FORTE** n'abîme pas les ongles.

Assurez-vous que la bouteille est bien fermée après chaque utilisation pour éviter l'évaporation du produit. Un surplus de produit peut se former sur le rebord du flacon.

Excilor® FORTE est une solution de 30 ml.

Effets secondaires

Vous ressentez une sensation d'irritation, de démangeaison ou une douleur légère et locale qui perdure. Arrêtez le traitement et consultez un pharmacien ou un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent. Veuillez signaler toute suspicion d'incident grave avec ce produit au fabricant à l'adresse info@excilor.com, ainsi qu'aux autorités de santé compétentes de votre pays, ceci est important pour la surveillance continue du rapport bénéfice/risque du produit.

Mesures de précautions

Produit à usage externe.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un des composants.
Appliquer sur l'ongle uniquement, éviter le contact avec la peau autour de l'ongle.
Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau. Il n'y a pas de données cliniques disponibles chez l'enfant, pendant la grossesse ou l'allaitement.
Les diabétiques ayant des problèmes aux pieds doivent consulter leur médecin avant de commencer le traitement **Excilor® FORTE**.
Ne pas utiliser après la date de péremption.

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante (5-25°) et à l'abri de la lumière ou d'une source de chaleur.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
Bien secouer la bouteille avant utilisation.
Bien refermer la bouteille après utilisation.

Ingrédients

Eau, polyuréthane, huile essentielle de menthe poivrée, acide acétique, sesquioléate de sorbitan, hexanediol, octanediol, alcool benzylique, gallate d'octyle, alcools de lanoline éthoxylés et acétylés, alcool phényléthylique, iodopropenyl butylcarbamate, gomme xanthane, acide déhydroacétique, éthylhexylglycérine, biotine

Brevet en cours



Dernière modification de la notice explicative : Novembre 2020