

® ONYKOLEÏNE^{DM}

Solution pour ongles mycosés

À propos de l'onychomycose (infection fongique de l'ongle)

L'infection fongique de l'ongle (également connue sous le nom d'onychomycose) peut affecter les ongles des orteils ou des doigts. Il s'agit d'une maladie relativement courante. Les symptômes les plus fréquents d'une infection fongique de l'ongle sont l'épaississement et la décoloration de l'ongle. Au fur et à mesure que l'infection progresse, l'ongle peut devenir cassant, friable et inesthétique. En l'absence de traitement, la peau peut devenir enflammée, douloureuse et dégager une odeur fétide.

Quelle est la cause de l'onychomycose ?

L'infection fongique de l'ongle résulte de la croissance de champignons sous, à l'intérieur ou sur l'ongle lui-même. Les champignons se développent dans les milieux chauds et humides. De nombreuses causes peuvent être à l'origine de l'infection fongique de l'ongle, mais certains facteurs de risque augmentent la probabilité de la voir se développer.

En voici quelques exemples :

- Pratique régulière d'activités sportives/athlétiques
- Fréquentation de piscines municipales
- Port de chaussures fermées
- Environnements chauds et humides
- Les personnes de plus de 65 ans et les diabétiques, du fait de leur système immunitaire déficient, sont plus susceptibles d'être atteints d'infections, notamment d'infections fongiques
- Personnes ayant eu une lésion à un ongle

Principe actif du produit

Avec son pinceau simple d'utilisation, ONYKOLEÏNE^{DM} aide à traiter et à prévenir l'infection fongique de l'ongle (connue également sous le nom d'onychomycose) sur les orteils ou sur les doigts.

ONYKOLEÏNE^{DM} agit en créant une barrière protectrice à la surface de l'ongle, qui protège les structures abîmées de l'ongle et empêche toute infection fongique supplémentaire de pénétrer dans l'ongle.

Les composants associés agissent comme une barrière mécanique formant un filtre qui isole l'ongle des agressions extérieures ambiantes. En outre, grâce à sa formule, ONYKOLEÏNE^{DM} contribue au maintien d'un pH acide de l'ongle, ce qui permet de contrôler le micro-environnement de l'ongle concerné en créant un environnement hostile dans lequel le champignon ne peut pas se développer. En plus d'aider à la guérison, ONYKOLEÏNE^{DM} contribue à améliorer l'aspect général de l'ongle et son état.

Comment l'utiliser ?

Appliquer ONYKOLEÏNE^{DM} au moins une fois par jour jusqu'à obtention de signes visibles d'amélioration. Appliquer de préférence le matin ou au coucher, et éviter de se mouiller les ongles après application.

Pour un résultat optimal, appliquer la solution ONYKOLEÏNE^{DM} jusqu'à la reprise de la croissance normale de l'ongle et la disparition de la partie abîmée.

La solution pour ongles ONYKOLEÏNE^{DM} peut également être utilisée comme traitement préventif contre l'apparition d'une mycose topique.

Application

1. Bien se laver les mains ou les pieds avant l'application.
2. La solution pour ongles ONYKOLEÏNE^{DM} doit être appliquée sur des ongles propres et exempts de vernis à ongles (ainsi que de tout résidu de dissolvant pour vernis à ongles)
3. Il est important d'appliquer une quantité suffisante de produit pour couvrir l'ensemble de l'ongle affecté, éviter le contact direct de la solution avec la peau environnante
4. Laisser sécher, éviter de porter des bas et/ou des chaussures pendant au moins 2 heures après l'application

Ne pas utiliser d'autres produits sur l'ongle, tels que vernis à ongles, poudres, sprays, etc, car cela pourrait réduire ou compromettre l'efficacité de la solution pour ongles ONYKOLEÏNE^{DM}.

Composition

ALCOOL DÉNATURÉ, EAU, URÉE, ACIDE LACTIQUE, ÉTHOXYDIGLYCOL, DÉCYLÈNE GLYCOL, POLYQUATERNIUM-7, HYDROXIDE DE SODIUM, HUILE DE THYMUS VULGARIS, CUIVRE USNATE.

Mises en garde

- ▶ ONYKOLEÏNE^{DM} est destiné exclusivement à l'usage individuel et ne doit pas être partagé
- ▶ Produit pour application topique sur ongles seulement. Ne pas appliquer le produit sur la peau et sous le bord inférieur des ongles. L'application du produit sur la peau peut entraîner une irritation ou une dermatite de contact irritative.
- ▶ À usage externe exclusivement
- ▶ Destiné à un usage spécifique
- ▶ Ne pas appliquer sur les plaies, peau blessée ou saignement.
- ▶ Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses (par ex. bouche, nez et autres orifices du corps) : en cas de contact avec les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment avec de l'eau et éventuellement demander un avis médical.
- ▶ Exclusivement destiné à l'adulte
- ▶ Tenir hors de portée des enfants
- ▶ Ne pas ingérer le produit
- ▶ Liquide inflammable
- ▶ Stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, loin de toute source de chaleur et de toute flamme, à température ambiante (entre 5° et 30° C)
- ▶ Ne pas utiliser si le contenant est détérioré
- ▶ Le produit n'a pas été évalué pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes enceinte/allaitante, veuillez demander conseil à votre médecin avant toute utilisation.
- ▶ Ne pas utiliser après la date d'expiration figurant sur l'emballage
- ▶ Visser le pinceau et conserver le flacon fermé après utilisation

Effets indésirables








L'utilisation de ONYKOLEÏNE^{DM} ne présente aucun effet secondaire notoire, utilisé et appliqué correctement selon les présentes indications d'utilisation. Toutefois, ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Informez votre médecin ou votre pharmacien de tout effet indésirable ou si les symptômes persistent.

Remarque importante

En cas de troubles persistants ou récurrents, veuillez en informer votre médecin. En cas d'aggravation des symptômes ou dès l'apparition d'une inflammation, d'une réaction allergique ou d'une infection, veuillez en informer votre médecin. Il est important de couper la partie abîmée de l'ongle pendant la croissance physiologique de celui-ci.

Interactions possibles

Il n'y a aucun effet secondaire connu résultant de l'application et de l'administration concomitantes de médicaments à visée antifongique administrables par voie cutanée ou par voie orale. En cas d'effets indésirables, veuillez signaler ceux-ci à votre pharmacien ou à votre médecin.

Symbole	Signification
	Fabricant
	Marque CE émise par un organisme notifié 0477
	Lire la notice avant toute utilisation du produit
	Stocker entre 5° et 30 °C
	Ne pas utiliser si le contenant est détérioré
	Date d'expiration
	Numéro de lot

Rev. 11-2019