

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

OSTEOCYNESINE VETERINAIRE®

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Un comprimé de 1 g contient :

Substance(s) active(s) :

Calcarea ostreica 2DH 26,00 mg,

Calcarea phosphorica 2DH 26,00 mg,

Calcarea fluorica 2DH 26,00 mg,

Sulfur iodatum 3CH 2,60 mg

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique « Liste des excipients ».

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé.

INFORMATIONS CLINIQUES

Espèces cibles

Toutes espèces.

Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Chez toutes les espèces

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles du métabolisme calcique.

Contre-indications

Aucune.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune.

Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez les femelles pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et en lactation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Non connues.

Posologie et voie d'administration

Voie orale.

Chiens : 2 à 3 comprimés deux fois par jour.

Chiots et chats : 1 à 2 comprimés deux fois par jour.

Chevaux adultes : 5 comprimés deux fois par jour.

Poulains : 4 comprimés deux fois par jour.

Agneaux, chevreaux, porcelets : 2 à 3 comprimés deux fois par jour.

Moutons, chèvres, veaux : 4 comprimés deux fois par jour.

Bovins adultes, vaches laitières : 5 comprimés deux fois par jour.

Porcs adultes, truies : 4 comprimés deux fois par jour.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Non connu.

Temps d'attente

Chevaux, ovins, caprins et bovins :

- Viande et abats : zéro jour
- Lait : zéro jour.

Porcins :

- Viande et abats : zéro jour.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe pharmacothérapeutique : Différents sels de calcium en association.

Code ATC-vet : QA12AA20.

Propriétés pharmacodynamiques

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues dans les matières médicales homéopathiques.

Caractéristiques pharmacocinétiques

Pas de données disponibles.

INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

Liste des excipients

Saccharose, Lactose, Stéarate de magnésium

Incompatibilités majeures

Non connues.

Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 5 ans.

Précautions particulières de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Nature et composition du conditionnement primaire

Pot polypropylène

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/3389423 0/1983

Boîte de 1 flacon de 100 comprimés

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation

05/07/1983 - 05/07/2008

Date de mise à jour du texte

30/09/2013