

# Pyrantel/Praziquantel

## Viatrix 230 mg / 20 mg

### COMPRIMÉS PELLICULÉS POUR CHATS

#### 1. Nom du médicament vétérinaire

Pyrantel/Praziquantel Viatrix 230 mg/20 mg comprimés pelliculés pour chats

#### 2. Composition

Un comprimé pelliculé contient :

##### Substances actives :

Pyrantel (sous forme d'embonate) . . . . . 80 mg  
(équivalent à 230 mg d'embonate de pyrantel)  
Praziquantel . . . . . 20 mg

Comprimé pelliculé blanc ou presque blanc, biconvexe, ovale, marqué d'un côté.  
Le comprimé peut être divisé en deux moitiés égales.

#### 3. Espèces cibles



Chats.

#### 4. Indications d'utilisation

Chez les chats :  
Traitement des infestations mixtes par les nématodes, les ankylostomes et les cestodes chez les chats, causées par :

- des ascarides (vers ronds) : *Toxocara cati* (adultes) ;
- des ankylostomes : *Ancylostoma tubaeforme* (adultes), *Ancylostoma braziliense* (adultes) ;
- des cestodes (vers plats) : *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Hydatigera* (*Taenia*) *taeniaeformis*, *Mesocestoides* spp., *Joyeuxiella pasqualei*.

#### 5. Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

Voir rubrique 6 « Mises en gardes particulières ».

#### 6. Mises en gardes particulières

##### Mises en gardes particulières :

L'infestation par les cestodes survient chez les chats au plus tôt dans la troisième semaine de vie. Les puces servent d'hôtes intermédiaires pour un type commun de cestodes, *Dipylidium caninum*. L'infestation par les cestodes peut réapparaître si un contrôle des hôtes intermédiaires, tels que les puces et les souris n'est pas entrepris.

Les pratiques suivantes doivent être évitées, car elles augmentent le risque de développement de résistances et pourraient conduire à une thérapie inefficace :

- Une utilisation trop fréquente et répétée d'anthelminthiques de la même classe, pendant une longue période.
- Un sous-dosage, qui peut être dû à une sous-estimation du poids corporel ou à une mauvaise administration du médicament vétérinaire.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Par mesure d'hygiène, les personnes administrant les comprimés directement au chat ou les ajoutant à sa nourriture, doivent se laver les mains après l'administration.

Les fractions de comprimé inutilisées doivent être remises dans la plaquette ouverte et conservé dans un endroit sécurisé et hors de la vue et de la portée des enfants.

##### Autres précautions :

L'échinococcose représente un danger pour l'homme. L'échinococcose est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE). Des directives spécifiques concernant le traitement et le suivi, ainsi que la protection des personnes, doivent être obtenues auprès de l'autorité compétente concernée.

##### Gestation :

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation.

Ne pas utiliser durant la gestation.

##### Lactation :

Peut être utilisé au cours de la lactation.

##### Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions :

Ne pas administrer simultanément avec de la pipérazine, car les effets spécifiques de la pipérazine (paralysie neuromusculaire du parasite) peuvent inhiber l'efficacité du pyrantel (paralysie spastique du parasite).

#### Surdosage :

Les symptômes de surdosage ne se produisent pas à moins de 5 fois la dose recommandée. Le premier signe d'intoxication attendu est le vomissement.

#### 7. Effets indésirables

Chats :

Très rare (<1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) :	Affections digestives (par exemple, hypersalivation et/ou le vomissement)* Troubles neurologiques (par exemple, ataxie)*
--	---

\*Légères et transitoires.

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Si vous constatez des effets indésirables, même ceux ne figurant pas sur cette notice, ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez contacter en premier lieu votre vétérinaire. Vous pouvez également notifier tout effet indésirable au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en utilisant les coordonnées figurant à la fin de cette notice, ou par l'intermédiaire de votre système national de notification :  
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (ANMV)  
<https://pharmacovigilance-anmv.anses.fr>

#### 8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d'administration

Voie orale. Pour une administration unique.

Posologie :  
5 mg de praziquantel et 20 mg de pyrantel (57,5 mg d'embonate de pyrantel) par kg de poids corporel, soit 1 comprimé pour 4 kg de poids corporel selon le tableau suivant :

Poids corporel	Nombre de comprimés par prise
1,0 à 2,0 kg	1/2
2,1 à 4,0 kg	1
4,1 à 6,0 kg	1 + 1/2
6,1 à 8,0 kg	2

Les chatons pesant moins de 1 kg ne doivent pas être traités avec le médicament vétérinaire, car la posologie correcte ne peut être garantie.

##### Voie d'administration :

Les comprimés doivent être administrés directement dans la bouche, mais peuvent être administrés dans une petite quantité de nourriture, si nécessaire.

#### 9. Indications nécessaires à une administration correcte

Afin de garantir une posologie appropriée, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible.

En cas d'infestation par des ascarides, en particulier chez les chatons, l'élimination complète des parasites est difficile, un risque d'infection pour les humains peut donc persister. Par conséquent, des traitements répétés avec un médicament vétérinaire nématocide approprié doivent être effectués à des intervalles de 14 jours jusqu'à 2-3 semaines après le sevrage.

En cas de persistance ou d'apparition de signes cliniques, consulter un vétérinaire.

#### 10. Temps d'attente

Sans objet.

#### 11. Précautions particulières de conservation

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver les demi-comprimés inutilisés à une température ne dépassant pas de 25°C. Chaque fois qu'un demi-comprimé inutilisé est conservé jusqu'à sa prochaine utilisation, il doit être remis dans la plaquette ouverte et conservé dans un endroit sûr et hors de la vue et de la portée des enfants.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 1 mois.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte après Exp. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

**12. Précautions particulières d'élimination**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Utiliser des dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable. Ces mesures devraient contribuer à protéger l'environnement.

Demandez à votre vétérinaire ou à votre pharmacien comment éliminer les médicaments dont vous n'avez plus besoin.

**13. Classification des médicaments vétérinaires**

Médicament vétérinaire soumis à ordonnance, sauf pour certaines présentations.

**14. Numéros d'autorisation de mise sur le marché et présentations**

FR/V/7418975 1/2017

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 2 comprimés.

**15. Date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois : 07/2025**

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données de l'Union sur les médicaments (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Coordonnées**

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :**  
KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Slovénie

**Fabricant responsable de la libération des lots :**  
KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450  
Jastrebarsko, Croatie  
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501  
Novo mesto, Slovénie

**Représentant local et coordonnées pour notifier les effets indésirables présumés :**

VIATRIS SANTE  
1 Rue de Turin  
69007 Lyon  
France  
Tél : 04 37 25 75 00

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Forme pharmaceutique	Contenance	Code ATC
Comprimé	200 mg	B01AC06
Comprimé	100 mg	B01AC06

Le présent médicament est soumis à ordonnance. Il est destiné à l'usage vétérinaire. Les informations relatives à l'usage humain ne sont pas applicables. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice.

Le présent médicament est soumis à ordonnance. Il est destiné à l'usage vétérinaire. Les informations relatives à l'usage humain ne sont pas applicables. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice.

Le présent médicament est soumis à ordonnance. Il est destiné à l'usage vétérinaire. Les informations relatives à l'usage humain ne sont pas applicables. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice.

Le présent médicament est soumis à ordonnance. Il est destiné à l'usage vétérinaire. Les informations relatives à l'usage humain ne sont pas applicables. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice.

Le présent médicament est soumis à ordonnance. Il est destiné à l'usage vétérinaire. Les informations relatives à l'usage humain ne sont pas applicables. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice.

Le présent médicament est soumis à ordonnance. Il est destiné à l'usage vétérinaire. Les informations relatives à l'usage humain ne sont pas applicables. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice. Les informations relatives à l'usage vétérinaire sont fournies dans la notice.

