

# Amylmétacrésol/ Alcool dichlorobenzyle

Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg **Miel-Citron**

Pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt ?

3. Comment prendre Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. Qu'est-ce que Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt et dans quels cas est-il utilisé ?

**Classe pharmacothérapeutique : DIVERS (ANTISEPTIQUES), code ATC : R02AA20.**

Ce médicament contient deux antiseptiques locaux (l'amylnétacrésol et l'alcool 2,4-dichlorobenzyle).

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt ?

**! Ne prenez jamais Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt :**

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- chez un enfant de moins de 6 ans.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt.

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche et de la gorge.

### Mal de gorge

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 3 jours : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.

### Aphtes, petites plaies de la bouche

En cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

### Enfants

Ce médicament ne peut pas être administré à des enfants de moins de 6 ans.

**Autres médicaments et Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt**  
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.  
Ce médicament contient 2 antiseptiques locaux (l'amylnétacrésol et de l'alcool 2,4-dichlorobenzyle).  
D'autres médicaments en contiennent : ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir « Comment prendre Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt »).

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. Comment conserver Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

**Ce que contient Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt**

- Les substances actives sont :  
Amylnétacrésol. . . . . 0,60 mg  
Alcool 2,4-dichlorobenzyle. . . . . 1,2 mg  
Pour une pastille.

- Les autres composants sont :  
Huile essentielle de menthe, jaune de quinine (E104), saccharine sodique, acide tartrique, colorant jaune orangé S (E110), essence de citron, arôme miel, isomalt (E953), maltitol (E965).

**Qu'est-ce qu'Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous la forme de pastilles de couleur jaune orange, rondes, sous plaquettes. Boîte de 24 pastilles.

**Titulaire-Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**MYLAN S.A.S.**  
117 Allée des Parcs  
69800 SAINT-PIERRE

### Fabricant

**SINCROFARM S.L.**  
C/ MERCURIO, 10, POL. IND. ALMEDA,  
CORNELLA DE LLOBREGAT,  
BARCELONA, 08940  
ESPAGNE

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est Septembre 2019.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et chez les femmes en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception.

### Allaitement

Un risque pour les nouveau-nés/nourrissons allaités ne peut être exclu. Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Ce médicament contient du maltitol (E965), de l'isomalt (E953) et du colorant jaune orangé S (E110).**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'isomalt (E953) et le maltitol (E965) peuvent avoir un effet laxatif léger.

Tenir compte de la valeur calorique 2,3 kcal/g d'isomalt (E953) ou de maltitol (E965).

Le colorant jaune orangé S (E110) peut provoquer des réactions allergiques.

## 3. Comment prendre Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

**RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.**

La dose recommandée chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans : 1 pastille, 3 à 6 fois par jour.

Sucer lentement la pastille sans la croquer, ni l'avaler en espaçant les prises.

Il est préférable de sucer la pastille à distance des repas.

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

Si vous avez l'impression que l'effet de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous avez pris plus de Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt que vous n'auriez dû :** Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de symptômes anormaux.

**Si vous oubliez de prendre Amylmétacrésol/Alcool dichlorobenzyle Mylan Conseil 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt :** Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- réactions allergiques.